

# Sommerfugler

Skrevet av Hypathia

---



Sommerfuglene er vakre innsekter som hageeiere setter stor pris på. De fleste forbinder sommerfugler med dagsommerfuglene, som ofte er fargesprakende og dagaktive. Det finnes rundt 3000 forskjellige sommerfugler i Norden, men dagsommerfuglene utgjør bare rundt 5% av disse. Resten er skumring- og nattaktive sommerfugler, såkalte nattsvermere og møll.

Ønsker du å få flere sommerfugler i hagen må du sørge for at både sommerfuglene og larvene har områder de kan trives i. På siden [sommerfuglprat på Hagegal](#) og [artikler om sommerfugler](#) finner du oversikter over hvilke planter sommerfuglene liker. På siden [andre sommerfugllinker](#) finner du oppskrift på hvordan du kan bygge ditt eget sommerfuglhus.



De fleste dagsommerfugler legger runde eller ovale egg, rundt 1-2 mm lange. Utviklingstiden for embryoet i egget avgjøres av lufttemperaturen, er sommeren varm tar det rundt 2 uker, er det kaldere kan samme utvikling ta 4 uker. Larven er spesialtilpasset å spise og vokse, kroppen er stort sett en innkledd tarmkanal med føtter. Jo større larven greier å spise seg, jo større blir den som fullvoksen sommerfugl. Larvene må ha en kroppstemperatur på 35-38 grader for å kunne 'smelte' maten og ta til seg næring. I kaldt vær vil derfor larvene bruke lang tid på å utvikle seg til sommerfugler.



## Sommerfugler

Skrevet av Hypathia

---

Bildene er [© Hypathia](#)